

Pilulky Čchi a krev (Shiquan Dabu Wan)



Tento známý prostředek tradiční čínské medicíny byl poprvé uveden v lékařském pojednání "Tai Ping Hui Min He Ji Ju Fang", napsaném v letech 1078-1085 n. l., během panování dynastie Song (960-1279 n. l.). Pilulky Shiquan Dabu Wan se používají při "nedostatku Qi a krve" - při astenickém syndromu, anémiích (nízkém hemoglobinu) různého původu, neurastenii, chronickém únavovém syndromu (CFS), při rehabilitaci pacientů po dlouhodobě závažných onemocněních a chirurgických zákrocích, v poporodním období atd.

Složení

Rou Gui, Chuan Xiong, Bai Shao Yao (Bai Shao), Huang Qi, Bai Zhu, Dang Gui, Dang Shen, Shu Di Huang, Fu Ling, Zhi Gan Cao, Feng Mi.

Působení dle TCM

Doplňuje Qi,
Vyživuje krev,
Ohřívá střední Zářič a posiluje Yang,
Posiluje Slezinu a Ledviny,
Normalizuje práci Žaludku.

Symptomy

Dušnost, slabost končetin, zejména v kolenech, chladné končetiny, spontánní pocení, závratě, nespavost, špatná chuť k jídlu, bledě žlutá pleť, palpitace, poruchy menstruačního cyklu, dlouhodobé vředy a furunkly, špatně se hojící rány, chronická slabost a únava. Jazyk je bledý, oteklý, s otisky zubů, povlak tenký bílý, puls tenký a prázdný.

Klinické indikace

Různé typy anémie
Stav po ztrátě krve
Dlouho nehojící se vředy, ekzém, furunkulóza (podle syndromu)
Cévní dystonie se sníženým krevním tlakem

Únava po závažných onemocněních, astenické-neurotický syndrom, pooperační a poporodní období
Chronický únavový syndrom
Onkologická onemocnění - snížení vedlejších účinků chemoterapie a radioterapie (pokles počtu bílých a červených krvinek, slabost, ztráta hmotnosti)
Menstruační poruchy
Častá nachlazení
Chronická atrofická gastritida a žaludeční ptóza
Sheehanův syndrom
Jako pomocný prostředek k léčbě cirhózy jater, rozedmy plic a diabetu

Forma výroby

Velké medové pilulky 10 ks po 9 g v blisteru.
MAXI balení!

Výrobce

Shanxi Huakang Pharmaceutical Co. Ltd, Čína.

Způsob podávání a dávkování

Užívejte 30 minut před nebo 1 hodinu po jídle ½ – 1 pilulku 1-2x denně nebo dle doporučení praktika TČM, přípravek rozžvýkat a zapít teplou vodou.

Opatření a zvláštní pokyny

Preparát by neměl být užíván při příznacích nadměrného horka (zvýšená tělesná teplota, zvýšený krevní tlak atd.)

<https://sinara.cz/katalog/pilulky-shiquan-dabu-wan/>
<https://sinara.cz/produkt/pilulky-shiquan-dabu-wan/>