

Pilulky jaterní rovnováhy (Shugan Hewei Wan)



Pilulky Shugan Hewei Wan se v tradiční čínské medicíně používají jako prostředek proti bolesti a spasmatům, uklidňuje játra, odstraňuje bolest. Inhibicí sekrece kyseliny chlorovodíkové pomáhá odstranit stagnaci potravy v žaludku a střevech. Posílením žaludeční motility zabraňuje vzniku zácpy. Schopnost odolávat oxidaci lipidů způsobuje, že pilulky normalizují funkce zažívacího systému. Recept těchto pilulek byl poprvé uveden lékařem Zhu Tianbi (1238-1298) v období vlády dynastie Ming.

Složení

Ingredience

Bai Shao Yao (Bai Shao), Bai Zhu, Bing Lang, Chai Hu, Chen Pi (Ju Pi), Gan Cao, Lai Fu Zi, Mu Xiang, Xiang Fu, Yu Jin, Wu Yao, Fo Shou Gan, Guang Huo Xiang, Feng Mi.

Působení dle TCM

Zklidňuje Játra,

Odstraňuje stagnaci Qi,

Normalizuje tok energie Žaludku a eliminuje bolest.

Používá se při poruše vztahu Jater a Žaludku.

Symptomy

Pocit těžkosti v obou hypochondriích, ztráta chuti k jídlu, škytavka, nevolnost, říhání, zvracení, bolest v epigastrické oblasti, může být jak průjem, tak zácpa (i jejích střídání), hořká chuť v ústech.

Klinické indikace

Chronická gastritida (včetně chronické formy)

Cholecystitida a zánět choledochu

Cholelitiáza

Divertikulóza duodena

Chronická hepatitida

Pankreatitida

Vředové onemocnění žaludku a dvanáctníku
Žaludeční neuróza
Zácpa
Mezižeberní neuralgie

Forma výroby

Velké medové pilulky 10 ks po 6 g. Každá pilulka je zabalena zvlášť do bílé umělohmotné kapsle.
MAXI balení!

Výrobce

Beijing Tongrentang Pharmaceutical Co., Ltd, Čína.

Způsob podávání a dávkování

Užívejte 30 minut po jídle ½ – 1 pilulku 1-2x denně nebo dle doporučení praktika TČM, přípravek rozžvýkat a zapít teplou vodou. Je účinnější při podání v období největší aktivity meridiánu Žlučníku a Jater (mezi 23. a 3. hodinou).

Opatření a zvláštní pokyny

Eliminovat užívání alkoholu, studených, kořeněných a slaných pokrmů, nekouřit. Nedoporučuje se společné užívání s tonizujícími prostředky TČM. Pacientům s hypertenzí, poruchou funkce jater, srdce, ledvin, s cukrovkou užívat pod dohledem lékaře. Pokud po podání přípravku vznikne průjem, je nutné dávku snížit. Těhotné a kojící ženy, děti, starší a oslabení pacienti, pacienti s prázdnou Sleziny (s kašovitou stolicí) by měli užívat přípravek pod lékařským dohledem.

<https://sinara.cz/katalog/pilulky-shugan-hewei-wan/>

<https://sinara.cz/produkt/pilulky-shugan-hewei-wan/>